

# Bulletin Santé Equidés

## Avril 2020



Printemps  
et Automne

### ● ● ● Fourbure et pâturage

La fourbure au pâturage est une **maladie générale** dont les manifestations se voient au niveau des pieds (principalement antérieurs) par inflammation des structures lamellaires qui fabriquent la corne des sabots. Il existe deux types de fourbures :


- **La fourbure aiguë**, caractérisée par une première crise qui survient soudainement avec douleur et inflammation des pieds. C'est une urgence médicale.
- **La fourbure chronique** affecte le cheval dans la durée et se manifeste par le basculement de la phalange distale (3<sup>ème</sup> phalange) à l'intérieur du sabot.

#### Facteurs de risques :

- **Obésité et insulino-résistance** : prédisposition génétique des races à faibles besoins énergétiques, comme les poneys et les ânes qui y sont particulièrement sensibles. Cependant, tous les équidés peuvent être concernés.
- **Maladies hormonales** : lors d'atteinte par le syndrome de Cushing ou le Syndrome Métabolique Equin.




- **Erreurs d'alimentation** : surconsommation de céréales, prairies riches, avec une herbe haute et chevaux avec accès à volonté, brutalement, sans transition.
- **Foyer infectieux** : non délivrance après le poulinage, diarrhée... Tout foyer infectieux peut déclencher une fourbure à n'importe quel moment.
- **Facteurs climatiques** : ensoleillement important et températures basses → Herbe riche en sucre



Paroi du sabot  
Lamelles:  
Tissu interne du  
pied des équidés

D'après JM, Denoix - 2000



## Signes cliniques :

- Report du poids sur l'arrière-main (attitude campée antérieure, sous-lui des postérieurs)
- Pieds chauds associés à un pouls digité important
- Sensibilité de la sole au niveau de la pince
- Elargissement de la ligne blanche
- Boiterie (marche sur des œufs)
- Désir se coucher



[www.ecurie-ribatejo.webnode.fr](http://www.ecurie-ribatejo.webnode.fr)



Source : [www.classequine.com](http://www.classequine.com)

**Traitement :** en premier lieu, le vétérinaire devra déterminer la cause de la fourbure et si possible l'éliminer.

- Diète avec un panier ou passage sur une pâture rase
- Cryothérapie : douchage des pieds à l'eau froide
- Traitement par des anti-inflammatoires prescrits par le vétérinaire pour gérer l'inflammation et la douleur
- Parage et ferrure adaptée

## Prévention :

- Gérer le poids de l'équidé et **éviter les mises à l'herbe brutales ou les prairies riches**
- Séparer la pâture en plusieurs petites parcelles pour limiter la surabondance d'herbe, ou mettre en place une clotûre mobile pour une avancée progressive
- Possibilité d'utiliser un **panier** spécial pour le pâturage.
- **Eviter au maximum les aliments concentrés** (céréales) et donner du fourrage pauvre.



Sources : [Equinessentiel](http://Equinessentiel) et [www.zenhorse.fr](http://www.zenhorse.fr)

## GDS de l' AISNE

Zone d'Activités du griffon  
CS 10 685  
02007 Barenton-Bugny Cedex



Téléphone: 03.23.22.50.92  
Télécopie: 03.23.22.51.07  
Messagerie: [gds02@reseaugds.com](mailto:gds02@reseaugds.com)