




Bonne rentrée à tous : petits & grands

POUR L'ÉQUIPE DU GDS, CE N'EST PAS UNE RENTRÉE COMME LES AUTRES !

Le directeur M. Vincent Fournier a laissé sa place à Mme Aude Brulin-Dorchy. C'est avec un pincement au cœur que nous avons dit au revoir à notre directeur, mais avec enthousiasme que nous accueillons notre nouvelle directrice à qui nous souhaitons la bienvenue!



SECTION ÉQUINE



Un peu de lecture pour cette rentrée : vous trouverez **ICI** le **Bulletin Santé Equidés**, toujours co-écrit avec un vétérinaire équin du GTV62. Cette fois, un focus sur la **myopathie atypique** : il faut être vigilant si vos prairies sont proches d'érables sycomores.

Rdv le jeudi **18 septembre** à la SCEA BRANQUART à Torcy.
Inscriptions au GDS

FORMATION NEW! BIOSECURITÉ

Une nouvelle thématique de formation biosécurité voit le jour : **"Biosécurité thématique accueil de public"**.

Cette formation est adressée aux élevages accueillant du public. Les contraintes spécifiques à cette pratique seront abordées et des solutions proposées.





SITUATION FCO

Cet été, la **FCO 3** et la **FCO 8** ont repris fortement, notamment en Normandie et Bretagne ! Dans le Pas de Calais, 6 foyers de **FCO 3** ont été déclarés et aucun foyer de **FCO 8** n'est détecté au 28 août.

Attention ! La vigilance reste de mise !

En cas de doute, faites dépister vos animaux, le dépistage est toujours pris en charge par l'Etat !



PROPHYLAXIES PETIT-RUMINANTS

Derniers jours pour faire réaliser les dépistages **BRUCELLOSE** chez les ovins et caprins.

La prophylaxie se termine le 30 Septembre !

Prenez rendez-vous sans tarder auprès de votre vétérinaire sanitaire.



UN TRIMESTRE, UNE ZOOSE

La cryptosporidiose

La **cryptosporidiose** est une maladie causée par un parasite protozoaire, *Cryptosporidium* sp. Elle cause des **problèmes digestifs** chez certains animaux, notamment les jeunes veaux, chevreaux, agneaux, porcelets, poulains et même les chiens et les chats. Ces animaux ont des diarrhées abondantes et une perte de poids.

Dans les premières semaines de vie, les veaux souffrent souvent de diarrhées néo-natales.

Pour en identifier la cause, **le LDA62 propose un kit d'analyses, remboursé à 50% !**

La cryptosporidiose est très fréquente à **partir du 5ème jour de vie**. Elle provoque une diarrhée, une déshydratation, une diminution de l'appétit et une faiblesse pouvant aller jusqu'à la mort.

Le traitement repose souvent par le **maintien de l'hydratation du veau**. Il est indispensable de **contacter son vétérinaire** pour établir un diagnostic et prendre les mesures adaptées.

La contamination est très rapide : 20 oocystes (œufs) suffisent pour infecter un veau, alors qu'un animal malade peut excréter des milliards chaque jour. Le parasite est **très résistant dans l'environnement** et difficile à éliminer totalement, mais on peut limiter sa propagation.

Les **mesures d'hygiène sont indispensables** : cases propres et désinfectées entre chaque veau, litière bien paillée. Le **colostrum doit être de bonne qualité** et distribué dans des contenants propres, en quantité suffisante. Les **veaux malades doivent être isolés** pour éviter la contamination.

La cryptosporidiose étant une **zoonose**, il est essentiel de protéger les personnes sensibles et en particulier les enfants.

La **transmission est oro-fécale**. Entre 2017 et 2019, 750 cas de cryptosporidiose humaine ont été notifiés en France (source : la santé de mon troupeau).

Des visiteurs d'une ferme pédagogique ont été affectés par cette pathologie au Royaume Uni après des contacts avec des animaux porteurs en avril 2025.

Le **principal symptôme est la diarrhée hydrique pendant 10 à 14 jours**.

Si vous contractez ce type de symptômes, pensez toujours à indiquer au médecin votre métier.

Pour vous protéger, **lavez vous régulièrement les mains**, en particulier avant et après les soins des veaux, et toujours avant de fumer, manger, boire. La contamination entre humains est également possible.

EHRLICHIOSE, CONTAMINATION PAR LES TIQUES



L'activité des tiques est maximale au printemps et à l'automne



L'ehrlichiose bovine est due à la bactérie *Anaplasma phagocytophilum* transmise par les tiques. Elle n'est de ce fait, pas contagieuse directement entre les bovins.


La période d'incubation est de 5 à 8 jours après morsure par une tique porteuse de la bactérie.

Les symptômes :

- Chute de production laitière
- Hyperthermie avec une perte d'activité et d'appétit
- Avortement et troubles de la reproduction
- Œdèmes des pâturons

Traitement : Antibiotiques

Prévention : Faire pâturer les génisses dans des parcelles à tiques et tailler les haies lorsque les animaux ne sont pas en pâture.



Remboursement de **50% de la facture** du laboratoire

Analyses demander lors de la visite vétérinaire **obligatoire** en cas d'avortement (Brucellose).

KITS "AVORTEMENTS"

Analyse individuelle + avorton

155€ HT
BVD, FQ, Chlamydie, Néosporose, Salmonellose, Listériose, Leptospirose, Campylobacter fetus, Ehrlichiose, BHV4 + bactériologie
Des frais d'identification et d'antibiogramme peuvent s'ajouter.

Analyses sérologiques groupées

BVD, FQ, Chlamydie, Néosporose
120€ HT

Analyses sérologiques groupées

240€ HT
BVD, FQ, Chlamydie, Néosporose + Ehrlichiose

Les analyses groupées sont à réaliser sur **6 bovins (ayant avorté ou à problème de reproduction)**




FIEVRE Q CHEZ L'HOMME - Quelques chiffres

Source : Comité Fièvre Q


81 foyers humains déclarés dans le monde depuis 1990 !



L'origine de la contamination est principalement le contact avec les ruminants, mais la Fièvre Q touche de plus en plus de personnes sans contact direct avec les animaux



Pays les plus touchés (nb de foyers humains)



WEEK-END À TERRE EN FOLIE !



Le GDS était présent les 23 & 24 août à Campigneulle-les-Petites pour vous rencontrer et échanger.
Prochain salon : Terres en fête !



source JA

Le *prix du Public* a été décerné à *Victoire*, de race Parthenaise, appartenant à l'EARL Bué Roussel de Contes. Félicitations à eux, et un grand bravo à tous les participants.

DÉFAUT DE CONSERVATION DES ENSILAGES ET ENRUBANNAGES



Baisse d'appétence mais pas que !

Les bactéries introduites au moment de la récolte risquent de se développer de manière fulgurante en cas de mauvaise conservation des fourrages.

Les besoins alimentaires ne seront pas couverts suffisamment en raison d'une baisse d'ingestion. Pire, **les problèmes sanitaires vont apparaître** : la redoutable Listeriose, le développement des germes butyriques, des levures et des moisissures (les mycotoxines) provoqueront **des troubles de la reproduction**, des **troubles hépatiques**, des hémorragies, une **baisse d'immunité générale**, des **mortalités...**

L'analyse du fourrage est indispensable pour ajuster la ration alimentaire, la recherche des mycotoxines complète à juste titre le bilan.

Le GDS prend en charge 50% des frais d'analyses mycotoxines réalisées dans un laboratoire référencé. Contactez nous!

